

Vivalis este responsabilă de **punerea în aplicare a politicilor de sănătate și de asistență personală** în regiunea Bruxelles. Vivalis este administrația Comisiei Comunitare Comune.

## RUJEOLA



- Rujeola este o **infecție virală extrem de contagioasă** care se transmite pe cale aeriană.
- Copiii sub 10 ani sunt considerați principalele persoane cu risc de a face boala.
- 30% dintre persoanele infectate riscă să dezvolte complicații. Acestea pot include infecții ale urechii, infecții pulmonare sau complicații mai grave care pot necesita spitalizare.

## Simptome

Rujeola se manifestă în principal prin **febră și o erupție cutanată** (pete roșii pe piele). Alte simptome mai puțin specifice pot include tuse, rinită sau inflamație a ochilor.



## Ce trebuie făcut în cazul simptomelor?

Dacă copilul dumneavoastră sau cineva din jurul dumneavoastră prezintă simptome sau dacă aveți dubii:

- Apelați medicul dumneavoastră **ÎNAINTE** de a merge la consultație.
- **Evitați** ca persoana simptomatică să intre în contact direct cu persoane nevaccinate sau vulnerabile (sugari, femei însărcinate etc.).
- **Nu permiteți copilului să participe la activități** sau să meargă la grădiniță până când medicul nu oferă undă verde.
- **Purtați o mască** (dumneavoastră și copilul) când mergeți la consultație.



## Cine sunt persoanele cu risc de complicații?

Persoanele care sunt cele mai expuse riscului de a dezvolta complicații grave în urma rujeolei sunt:

- Persoanele neimunizate (cele care nu au primit nicio doză de vaccin sau nu au avut rujeola)
- Persoanele imunodeprimăte sau cu un sistem imunitar slăbit
- Femeile însărcinate
- Sugarii sub 12 luni



## Toți vaccinați, toți protejați!

**Vaccinarea cu 2 doze** de vaccin ROR (Rujeolă-Rubeolă-Oreion) este singura protecție **eficientă** împotriva bolii.

- **Verificați statutul vaccinal al dumneavoastră și al copilului.** Conform calendarului de vaccinare belgian, prima doză se administrează la 12 luni, iar a doua între 7 și 9 ani.
- Persoanele care au avut deja rujeola (o mare parte a populației născută înainte de 1970) sau care au primit două doze de vaccin sunt protejate și nu necesită vaccinare.
- **Persoanele născute între 1970 și 1985** au o probabilitate mare de a fi insuficient protejate, deoarece este posibil să fi primit doar o singură doză de vaccin.
- În caz de dubiu, prezentați-vă la medicul dumneavoastră sau la pediatru cu carnetele de vaccinare pentru a verifica statutul vaccinal al familiei.



## Unde să vă vaccinați?

- **Pentru copii**, fie la medicul de familie, la pediatru, la o consultație pentru sugari organizată de ONE sau prin intermediul Serviciilor de Promovare a Sănătății la Școală (PSE). Acest vaccin este pus la dispoziție gratuit.
- **Pentru un adult**, contactați medicul de familie.

**!** Pentru o persoană neimunizată, o vaccinare în decurs de 72 de ore după contactul cu boala protejează împotriva apariției acesteia.