

Infection des voies urinaires

Diagnostic chez les habitants sans cathéter vésical

≥ 2 SYMPTÔMES URINAIRES TYPIQUES OU 1 SYMPTÔME URINAIRE TRÈS GÊNANT

- Dysurie (accrue)
- Douleur ou sensibilité sus-pubienne et/ou douleur du flanc apparues récemment
- Pollakiurie (accrue)
- Impériosité mictionnelle (accrue)
- Incontinence urinaire (accrue)
- Écoulement visible de pus urétral

1 SYMPTÔME URINAIRE TYPIQUE ET ≥ 1 SYMPTÔME SYSTÉMIQUE

Symptômes systémiques évocateurs d'infection

- Fièvre ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) ou hypothermie ($< 35^{\circ}\text{C}$)
- Frissons solennels

Symptômes systémiques atypiques, moins évocateurs

- Délire évident (accru)
- Agitation (accrue)
- Dégradation de l'état général ou affaiblissement
- Hématurie macroscopique

AUTRES SYMPTÔMES

- Changement de couleur ou de concentration
- Changement d'odeur (urine malodorante)
- Urine trouble
- Symptôme gynécologique (prurit, écoulement vaginal)

ÉVALUEZ L'ÉTAT D'HYDRATATION

Encouragez l'apport hydrique

ENVISAGEZ AUSSI D'AUTRES CAUSES

PRÉLÈVEMENT D'UN ÉCHANTILLON D'URINE À MI-JET

- Avant de commander les antibiotiques
- Après une toilette intime
- Alternative : cathétérisme unique, cathéter préservatif, collecte d'urine dans un récipient stérile
- Ne prélevez jamais les urines dans la panne
- Placez l'échantillon d'urine le plus rapidement possible au réfrigérateur ($2-8^{\circ}\text{C}$) pendant 24 heures maximum jusqu'à son traitement par le laboratoire

DÉBUT DE L'ANTIBIOTHÉRAPIE

Dans la mesure du possible, attendez les résultats de la culture, sauf en cas de symptômes systémiques et/ou évocateurs d'une pyélonéphrite.

BANDETTES URINAIRES NON RECOMMANDÉES

- **Bandelette positive** : nécessite une culture d'urine complémentaire afin de diagnostiquer une infection urinaire.
- **Bandelette négative** : bon indicateur d'exclusion d'une infection urinaire.

REMARQUE

Chez les habitants atteints de troubles cognitifs avancés, les symptômes urinaires typiques peuvent être absents ou difficiles à interpréter. Le médecin peut alors décider de prélever un échantillon d'urine en l'absence de symptômes typiques et commencer une antibiothérapie après avoir écarté d'autres causes possibles, infectieuses ou non.

