

# Urineweginfecties

## Diagnostiek bij bewoners zonder blaaskatheter

### ≥ 2 TYPISCHE URINAIRE SYMPTOMEN OF 1 ZEER HINDERLIJK TYPISCH URINAIR SYMPTOOM

- (Toegenomen) dysurie
- Recent ontstane suprapubische pijn of gevoeligheid en/of flankpijn
- (Toegenomen) pollakisurie
- (Toegenomen) mictiedrang
- (Toegenomen) urine-incontinentie
- Zichtbare urethrale pusafscheiding

### 1 TYPISCH URINAIR SYMPTOOM EN ≥ 1 SYSTEMISCH SYMPTOOM

#### Infectie-suggestieve systemische symptomen

- Koorts ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) of hypothermie ( $< 35^{\circ}\text{C}$ )
- Koude rillingen

#### Atypische, minder suggestieve systemische symptomen

- Duidelijk delier
- (Toegenomen) agitatie
- Algemene malaise of verzwakking
- Macroscopische hematurie: bloed in urine

### ANDERE SYMPTOMEN

- Verandering in kleur of concentratie
- Verandering in geur (slecht ruikende urine)
- Troebele urine
- Gynaecologisch symptoom (jeuk, vaginale afscheiding)

### EVALUEER HYDRATATIE-TOESTAND

Stimuleer de vochtintake

### OVERWEEG OOK ANDERE OORZAKEN

### NOTA

Bij bewoners met gevorderde cognitieve beperkingen zijn de typische urinaire symptomen afwezig of moeilijk te interpreteren/communiceren. De arts kan beslissen om enkel bij aanwezigheid van atypische en/of systemische symptomen een urinestaal af te nemen en antibioticatherapie op te starten nadat andere mogelijke (niet-)infectieuze oorzaken worden uitgesloten.

### AFNAME MIDSTREAM URINESTAAL

- Vóór opstart antibioticatherapie
- Na intiem toilet
- Alternatief: eenmalige katheterisatie, condoomkatheter, urine opvangen in een steriel recipiënt
- Neem nooit urine uit de bedpan
- Bewaar het urinestaal, zo snel mogelijk, in de koelkast ( $2-8^{\circ}\text{C}$ ) gedurende max. 24u. tot ophaling door het labo

### OPSTART ANTIBIOTICATHERAPIE

Indien mogelijk, wacht op cultuurresultaten behalve in het geval van systemische symptomen en/of symptomen die wijzen op pyelonefritis.

### URINE DIPSTICK IS AFGERADEN

- **Positieve dipstick:** een extra urinekweek is nodig om de diagnose urineweginfectie te stellen.
- **Negatieve dipstick:** goede uitsluiter om een urineweginfectie uit te sluiten.

